


ימות שיניים כגורם לירידה במשקל



הפה מכיל 36 (נקבה) ו40 (זכר)

כל חצי לסת מכילה:

3 חותכות

1 ניב (לא תמיד

נקבות)

3-4 טוחנות

ראשונות (פרמולר)

3 טוחנות שניות.

שיני זאב- גורם


מפריע!

שיני חלב מול שיניים

קבועות.

אופן האכילה של סוס



פתחות נקודות חדות בשיניים?






סימנים לבעיות שיניים



- אופן אכילה חריג, (אוכל שנופל, סיבוב הראש, ריור מוגבר).
- סירוב לאכול, אכילה איטית, בררנות באוכל.
- ריח רע מהפה
- סיבי חציר ארוכים בצואה.
- איבוד משקל.
- נפיחות בלסת תחתונה ולחיים.
- התנגדות למתג.




מומלץ לעשות בדיקת שיניים מדי שנה,
לטפל, לתחזק ולהחליק קצוות חדים.



סוסים מבוגרים עם נטייה למחלות חניכיים, חשוב
לבדוק את האפשרות של שבר שיניים, שורשים
חולים, ושיניים רופפות.



ירידה במשקל מרעה רמה 17



שיני
ים



לעים כגורם לירידה במשקל



- בעלי חיים חסרי חוליות אשר משתייכים לשלוש מערכות:


- מערכת תולעים שטוחות

- מערכת תולעים טבעתיות

- מערכת תולעים נימיות

- תולעים הם פרזיטים פנימיים המורידים את יכולת הסוס לעמוד בפני זיהומים, גוזלים מהסוס הזנה יקרה ולעיתים גורמים נזק בלתי הפיך לאיברים פנימיים

ימות שיניים כגורם לירידה במשקל



הפה מכיל 36 (נקבה) ו40 (זכר)

כל חצי לסת מכילה:

3 חותכות

1 ניב (לא תמיד

נקבות)

3-4 טוחנות

ראשונות (פרמולר)

3 טוחנות שניות.

שיני זאב- גורם


מפריע!

שיני חלב מול שיניים

קבועות.

אופן האכילה של סוס



פתחות נקודות חדות בשיניים?






סימנים לבעיות שיניים



- אופן אכילה חריג, (אוכל שנופל, סיבוב הראש, ריור מוגבר).
- סירוב לאכול, אכילה איטית, בררנות באוכל.
- ריח רע מהפה
- סיבי חציר ארוכים בצואה.
- איבוד משקל.
- נפיחות בלסת תחתונה ולחיים.
- התנגדות למתג.



מומלץ לעשות בדיקת שיניים מדי שנה,
לטפל, לתחזק ולהחליק קצוות חדים.



סוסים מבוגרים עם נטייה למחלות חניכיים, חשוב
לבדוק את האפשרות של שבר שיניים, שורשים
חולים, ושיניים רופפות.

לעים כגורם לירידה במשקל



- בעלי חיים חסרי חוליות אשר משתייכים לשלוש מערכות:


- מערכת תולעים שטוחות

- מערכת תולעים טבעתיות

- מערכת תולעים נימיות

- תולעים הם פרזיטים פנימיים המורידים את יכולת הסוס לעמוד בפני זיהומים, גוזלים מהסוס הזנה יקרה ולעיתים גורמים נזק בלתי הפיך לאיברים פנימיים

מעגל ההדבקה




סוגי תולעים

ישנם יותר מ 150 מינים של פרזיטים פנימיים המדביקים את הסוס
היותר נפוצים ובעייתיים הם:



- סטרונגילידים גדולים וקטנים
- תולעים עגולות, Ascarids
- תולעי סיכה, Pinworms
- תולעי סרט, Tapeworms
- רימות של זבוב הגסטרופילוס Bots

מעגל ההדבקה



סוגי תולעים

ישנם יותר מ 150 מינים של פרזיטים פנימיים המדביקים את הסוס
היותר נפוצים ובעייתיים הם:



- סטרונגילידים גדולים וקטנים
- תולעים עגולות, Ascarids
- תולעי סיכה, Pinworms
- תולעי סרט, Tapeworms
- רימות של זבוב הגסטרופילוס Bots

סוגי תולעים



הזחלים חודרים את קירות המעי ונודדים בכלי הדם של מערכת העיכול. בכמויות גדולות הזחלים יכולים לגרום לנזק רב כמו אנמיה (חסר בדם) או קוליק ואף מוות

סטרונגליד גדול



הזחלים נשארים במערכת העיכול, מתחפרים בדפנות המעי וממגנים עצמם במבנה דמוי ציסטה. הזחלים שוהים כך מספר חודשים בהם אינם מושפעים מרוב חומרי התילוע. הזחלים גורמים נזק רב לדפנות המעי ויכולים לגרום לקוליק או שלשול


סטרונגילי ד קטן



התולעת הבוגרת מגיעה לאורך של מספר סנטימטרים וכמעט בעובי של עפרון. בנגיעות גבוהה בסייחים (בגילאים 3-12 חודשים) יכולים לגרום לחסימה במעי, בעיקר בעקבות תלוע ראשון שמתבצע בסייח עם נגיעות קשה. הזחלים נודדים דרך הכבד ומגיעים לריאות, לאחר שיעול הו מגיעות לחלל האף והפה ונבלעות ח משלימות את מו

**תולעים עגולות
Ascarids**


סימנים קליניים בסוסים





- הסימנים הקליניים לא תמיד נראים על הסוס
- נפוץ יותר לראות את ההשפעה אצל חיות צעירות, זקנות או חולות
- לרוב הסימנים כוללים ירידה במשקל או עליה איטית מידי במשקל, חוסר התפתחות בסייחים, מצב גופני ירוד, שיער דליל, עייפות וכדומה



- חלק מהטפילים גורמים לשלשול, ירידה בתאבון וקוליק
- תולעים הנודדות לריאות יגרמו לשיעול והפרשות מהאף. במצבי נגיעות קשה בטפילים יתכן גם מוות
- תולעים הנודדים בתוך דפנות כלי הדם גורמים לקרישי דם ולפסג דם (אנמיה)







מניעה וטיפול

בדיקות צואה

- בבדיקות צואה אין רואים תולעים, ניתן לראות ולספור את כמויות הביצים של התולעים (רק ביצי תולעים עגולות וסטרונגילים)
- אי נוכחות ביצים אינה מעידה על חוסר בתולעים או חוסר שלבים מוקדמים (רימות)

פעולות מנע

- מניעת מגע עם צואה טרייה (ביצים מדבקות)
- השמדת ביצי הבוץ על שערות הסוס
- החלפת שטחי מרעה.
- ניקוי וחיטוי האורות (בעיקר לפני המלטה)
- ביצוע טיפולי תילוע תקופתיים לרבות תילוע סוסות לפני המלטה



חומרי התילוע

Moxidectin



Ivermectin



חשוב לזכור, גיוון
ושילוב אינם
נחשבים למעשה
מגונה!

Fenbendazole



Pyrantel



לסיכום, פרוטוקול תילוע



סוס בוגר	קץ- בדיקת צואה	סתיו- תילוע I	חורף- תילוע II	אביב- תילוע III
סוסות בהריון וסייחים	תילוע חודש לפני המלטה	תילוע גיל חודש I	תילוע גיל 3 חודשים II (לתלע גם את אמא עם אותו החומר)	תילוע גיל 7 חודשים- III
				הצטרפות לתוכנית של הסוסים הבוגרים (אלא אם יש עומס תולעים גדול)

שאלות?



כל רדברים, מבריקים כמים
כל היצורים, גדולים בקטנים,
כל רדברים, נבונים כמוסלאים,
כולם
למריה לנה נהדרת

SivanVet
רפואת סוסים

052-5866421 | קיבוץ גשור, רמת הגולן, 12942 | פקס: 04-6769168

