

# חדש על המדף

יצחק רן, חוקר פרחים מו"פ צפון

## שזיף פיסרדי-*Prunus pisardii*

### משפחה: הורדניים (Reosaceae)



עץ נשיר, מין של שזיף יפני, בעל עלים אדומים ופירות אדמדמים טעימים. העץ יכול להגיע לגובה של 8 מ' בתנאי גידול טובים והוא בעל עוצמת צימוח גבוהה. באזורים שבהם החורף מתון העץ מגלה תכונות של נשיר מאולץ. המיוחד בשזיף הפיסרדי הוא המופע הנאה של הענפים והעלים, שלהם גוון אדום-סגול. ניתן להשתמש בענפים לסידורים, כאשר הצימוח האמירי הצעיר בהיר מעט, וכן בענפים ערומים מעלים, שצבעם סגול כהה.

בארץ מגדלים את השזיף הפיסרדי כענף קישוט מזה 5 שנים, בעיקר לשוק המקומי והמוצר תפס נישה בהיקף של כ-200 אלף ענפים לשנה. משלוחים נסיוניים קטנים לבורסות לא קיבלו מחיר יציב לאורך זמן.

קטיף הענפים מתחיל בגל אביבי של מחצית מאי ולאחר מכן ניתן לקבל עוד שני גלים, האחד ביולי והשני באוקטובר. הגל הקיצי והסתוי אינם גלים מרוכזים כמו האביבי. בסך הכל ניתן להגיע ליבול של כ-40 אלף ענפים לדונם בשלושת הגלים, כאשר שותלים 500 עצים לדונם (במרווחי שתילה של 2x1 מ').



ניתן לגדל את השזיף הפיסרדי בכל אזורי הארץ, אבל נראה, שלאזור ההר הבינוני יהיה יתרון על פני אזורים אחרים באיכות הענפים וביבול (הנושא לא נבדק השוואתית).

**ריבוי:** שתילים מורכבים על כנת מריאנה (שזיף בר), שמרבים אותה באופן וגטיבי.

**חיי מדף:** כ-10 ימים, בתנאי שהקטיף מתבצע בבוקר מוקדם למים ולאחר מכן הענפים מטופלים בתמיסת ויטקס 300 בריכוז 1%.

**שלב קטיף:** במצב צימוח דינמי של אמירי הצימוח, באורך של 60 ס"מ ומעלה.

**שיווק:** לא מופיעים נתונים על שיווק המוצר בספר הנתונים של ה-V.B.N.

**הנישה שלבו:** יש מקום לשווק כמויות נסיוניות בהיקף גדול יותר מאלו ששווקו עד כה, עם דגש על הגלים האביבי והסתוי, כיוון שבקיץ הקטיף קשה יותר מבחינת הטיפול בענף ובחודשים יולי-אוגוסט הביקוש בבורסות נמוך בדרך כלל.

**מוצר מתחרה/חלופי:** הקוטינוס מהווה מוצר כזה וזוהי סיבה טובה להימנע מקטיף לאחר מחצית יוני ולפני מחצית ספטמבר.