

**פרוטוקול המהד"ם להדברה ושמירה על רמה נמוכה של מזיקי השקד
(מעודכן 03/2017)**

• **צרת השקד**

1. בחורף כדאי לבצע סניטציה הכוללת איסוף וסילוק של כל המומיות מהעצים.
2. לאחר גיחת הבוגרים מרססים עם קוטלי חרקים סיסטמיים.
3. בשטחים שבהם בוצעה סניטציה ובהם נמצאה נגיעות אפסית אשתקד ואין בקרבנם חלקות שכנות נגועות - שוקלים הפחתה במספר הריסוסים בזנים הפחות רגישים.

• **עש החרוב**

4. בחורף כדאי לבצע סניטציה הכוללת איסוף וסילוק של כל השקדים שנשארו על העצים ועל הקרקע לאחר הקטיפה.
5. את שני הטיפולים הראשונים עם קוטלי חרקים בעונה מתזמנים לפי הופעת הבוגרים של הדור הראשון.
6. קביעת מועד הגיחה של הבוגרים בדור הראשון לפי ניטור במלכודות ולפי התפתחותם בשקדים נגועים.
7. עדיפות להצבת מלכודות הניטור על במבוק בגובה 3 מטר.

• **עש המשמש (אנרסיה)**

8. הצבת נדיפיות לבלבול זכרים במינון של 40 יחידות לדונם בצמרת העץ.
9. במטעים השכנים לגלעיניים אחרים כדאי ליישם את שיטת הבלבול הזכרים באופן אזורי.
10. מציבים מלכודות לניטור על במבוק בגובה 3 מטר כדי לעקוב אחר רמת האוכלוסייה ויעילות הבלבול.