

אובדים לא משק יציבותי ואפסיקים בהצטרפה את השימוש ברפסלים

**פרוטוקול המהד"ם להדברה ושמירה על רמה נמוכה של אוכלוסיית סס הנמר
(מעודכן 03/2017)**

● **כללי** – הסיבות העיקריות לעלייה באוכלוסיית סס הנמר

1. הפחתת השימוש בתכשירים ושינוי בסוג התכשירים להדברת מזיקי המטע.
2. התחמקות דרגת הזחל הנובר בשלד העץ ומוגן מתכשירי ההדברה.
3. גיחה של בוגרים בקיץ והתבססות האוכלוסייה בחודשי הקיץ כאשר לא נעשה שימוש בקוטלי חרקים.

● **המטרות**

4. להביא להפחתה משמעותית באוכלוסיית סס הנמר ולהפחתה בנוק בעצים.
5. ליישם ולהטמיע בשגרת המטע טכניקה לבדיקת נגיעות ולטיפול אגרו-טכני ללא קוטלי חרקים.

● **שיטות הניטור וההדברה**

6. כדי לשמור על רמה נמוכה של אוכלוסיית סס הנמר כדאי לבדוק ולטפל בעצים נגועים בחודשים פברואר-מרץ.
7. **שיטת הבדיקה**: בודקים בכל שורה שלישית (30% מהעצים במטע) סך עצים נגועים מתוך סך העצים בשורה (כל עץ עם מחילה אחת פעילה נחשב כעץ נגוע).
8. את נתוני הנגיעות מרכזים בטבלה:

סך עם נזק	סך עם נזק				
יקרונית	סס נמר	סך עצים	זן	שורה	חלקה

9. **שיטת הטיפול**: ברמת נגיעות של פחות מ- 1% מוציאים את הזחלים מהמחילה בעזרת חוט פלדה. ברמת נגיעות גבוהה מ- 1% עצים נגועים מוציאים זחלים עם חוט פלדה ומשלבים טיפולים עם קוטלי חרקים בקיץ לאחר הופעת עלי דגל.