

## דילול כימי להגדלת פרי ולהקטנת הסירוגיות בתפוח זהוב - דוח 2007

### רפי שטרן

#### מבוא

דילול כימי בתפוח זהוב הופך כיום לבעיה, כיוון שהשימוש המקובל בתכשיר סוויץ' לדילול חנטים ייאסר כנראה לשימוש מסחרי. בכוונתנו לחפש תחליפים אפשריים לדילול חנטים כמו ריסוס בריכוז גבוה של הציטוקינין הסינטטי BA המקובל בארה"ב לדילול חנטים בזני תפוח שונים. ה-BA עשוי להשפיע לא רק על דילול אלא גם באופן ישיר על הגדלת הפרי. כמו כן בחנו ב-2006 את ה"אגריטון", שהוא שילוב מעניין של NAD, הנמצא ב"דילאמיד", יחד עם NAA, הנמצא ב"אלפנול". התוצאות שהתקבלו היו מעניינות ביותר, ובשנה זו הרחבנו את טווח הריכוזים שלו ועברנו לשלב של ריסוסי מפוח (מודל).

#### מטרות

1. מעקב רב שנתי אחר הטיפול המצטיין מניסויים קודמים (NAD+BA+סוויץ') לדילול, הגדלת פרי והקטנת סרוגיות בין השנים.
2. בחינת ה"אגריטון" כתחליף לדילאמיד ולסוויץ'
3. ביטול הדילול הידני היקר ע"י טיפולי דילול כימי מצטיינים

#### חומרים ושיטות

הניסוי נערך בחוות מתתיהו על עצי זהוב בוגרים (נטיעת 1990, מרחקי נטיעה 2.5 X 4.5), בעלי פוריות רב-שנתית גבוהה (חלקה י').

#### התכשירים שנבדקו

דילאמיד 80 ח"מ NAD

אגריטון 0.44% : מכיל 80 ח"מ NAD + 30 ח"מ NAA

אגריטון 0.30% : מכיל 55 ח"מ NAD + 20 ח"מ NAA

בונגרו 100 ח"מ BA

סוויץ' 0.12%

הטיפולים שניתנו

1. דילאמיד (80 ח"מ NAD בש.פ. +3) + בונגרו (100 ח"מ BA בש.פ. +14) + סוויץ' (0.12% בש.פ. +21).
2. אגריטון (0.44% בש.פ. +3) + בונגרו (100 ח"מ BA בש.פ. +14)
3. אגריטון (0.30% בש.פ. +3) + בונגרו (100 ח"מ BA בש.פ. +14)

## הערות

1. טיפול 1 הוא הטיפול המצטיין שנמצא בניסויים של 2005+2006
2. טיפולים 2+3 ניתנו ללא סוויץ
3. כל הטיפולים ניתנו ללא דילול ידני
4. לכל הטיפולים הוספנו טריטון X 100 בריכוז 0.025%
5. הריסוס בוצע בעזרת מרסס מפוח בנפח תרסיס של 180 ליטר/ד' (דילאמיד ואגריטון) או 120 ליטר/ד' (בונגרו).

## המדדים שנבדקו

יבול לעץ והתפלגות הגדלים של הפרי

## תוצאות

### יבול כללי


למרות טיפולי הדילול התקבלו יבולים גבוהים יחסית של כ-120 עד 130 ק"ג/עץ ללא הבדל בין הטיפולים (איור 1). עם זאת, על אף היבול הגבוה לעץ התקבל גם שיעור גבוה מאוד של פרי בינוני (70 מ"מ) וגדול (>75 מ"מ) בסדר גודל של כ-85% (כ-110 ק"ג/עץ פרי בינוני וגדול מתוך כ-130 ק"ג/עץ) (איור 2). יש להניח שהיבול הגבוה של הפרי הגדול התקבל כתוצאה מהפחתת מספר הפירות בעקבות טיפולי הדילול (אין "ביקורת לא מדוללת" שאפשר להשוות אליה. השארנו ביקורת כזו בניסויים הרבים שעשינו בעבר, והראנו שללא דילול כלל הפרי שמתקבל היה ברובו קטן).

### התפלגות גדלים

הטיפול המצטיין עד כה של דילאמיד (NAD) + בונגרו (BA) + סוויץ נתן תוצאה טובה של מעט פרי קטן והרבה פרי גדול. עם זאת בטיפול ה"אגריטון" עם הריכוז הגבוה של 0.44% התקבלה התפלגות גדלים עוד יותר טובה, עם שיא של 74 ק"ג/עץ פרי גדול. ה"אגריטון" בריכוז הנמוך של 0.3% היה פחות טוב מהריכוז הגבוה, ואף פחות טוב מהטיפול המצטיין עד כה (NAD + BA + סוויץ) והוא נתן מעט פרי גדול והרבה מאוד פרי קטן.

לסיכום שנת המודל הראשונה ניתן לומר שלאגריטון (בשילוב עם BA) יש פוטנציאל טוב להחלפת הסוויץ, ולהחלפת הצורך בדילול ידני. כאשר ניתן במקום הדילאמיד ובריכוז גבוה של 0.44% (שווה ערך ל-80 ח"מ NAD שיש בדילאמיד אך בתוספת 30 ח"מ NAA) יעילותו כמדלל עולה, עד כדי כך שלא צריך להוסיף סוויץ בשלב מאוחר יותר (ש.פ. + 21) או לבצע דילול ידני מתקן. בשנה העוקבת (2008) ייערך סקר פריחה באותם עצים: יינתנו שוב אותם טיפולים לאותם עצים, וייבחנו היבול והתפלגות הגדלים.

איור 1. השפעת טיפולי דילול שונים על היבול הכללי, מתתיהו 2007.



איור 2. השפעת טיפולי דילול שונים על התפלגות הגדלים של הפרי, מתתיהו 2007.

