

**מיוזם לאיתור ופיתוח תחליפי ציאנאמיד חומצى לשבירת תרדמתה בגפן
ובבנשירים**

**Identification and development of cianamid substitute for
dormancy release in table grapes and deciduous fruit trees.**

קוד זיהוי: 596-557-16

דו"ח סיכום 2016

מוגש ע"י

רפִי שטרן, עומר קראין, עמוס נאור, אמנון ארז

הצהרת החוקר הראשי:

המצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים.

הניסויים אינם מהווים המלצות לחקלאים:



דצמבר 2016

דוח סיכום: מיזום לאיתור ופיתוח תחליפי ציאנאמיד לחומץ לשבירת תרדמת בנשירים

Identification and development of cyanamide substitute for dormancy release in deciduous fruit trees.

תכנית מס' 596-0557-16

מוגש ע"י

רפ' שטרן, עומר קראין, עמוס נאור, אמנון ארז
שמעון אנטמן, ישראל דורון, יעל גרינבלט

מבוא:

בנשירים שמוקורים באזוריים ממוגעים חווים בחשיפה לקור ("מנות צינון") על מנת לסייעו תרדמת הפקעים החורפיים. באזורי גידול בעלי חורף חמ, כמו רובים מאורי הגידול בארץ, לא מתאפשרה הצבירה המותבקשת של "מנות צינון" ולפיכך סוגית השחרור מתרדמה היא מכשלה מהותית בגידול כלכלי ונדרש פתרון יוזם ו"מלאכוטי" לשבירת תרדמת מוקדמת ו/או אחידה. ידע רב נצבר בארץ ובעולם בנושא זה והוא כוונון חומרם כימיים שיישומם בעיתוי הנכוון גורם לשבירת התרדמת גם כשלא נצברה מכסת הקור הדורשה להתעוררות טبيعית תקינה. יחד עם זאת מרבית החומרם, מספקים פתרון חלקי במספר מנינים/אזורים (כמו תפוח ואפרסק/נקטרינה בהר הגבורה) אך אין נווגנים פתרון מספק ברוב המקרים (גפן, קיווי, דובדבן, חלק מזוני האגס, אפרסק מוקדם). ציאנאמיד לחומץ (HC), לעומת זאת, ידוע ביעילותו הגבוהה, מאפשר לשבירת תרדמת Achaea ומוקדמת, מוביל לשיפור אחוזי ההתעוררות גם במינימ זנים "קשה לעורף" ומודען לשימוש בפרקטייה החקלאית. לרוע המזל, יכולתו של החומר להשרות עקה נשימית, המפעילה שרשות תהליכי שמשתיימת בשחרור המריסטמה מעיקוב תהליכי צמיחה, אחראית גם לטופסיות של החומר, לצמחים עצם ולסבירותם. פוטנציאל הסיכון של החומר הביא לפיסילתו באירופה והוביל להנחיה של השירותים להגנת הצומח להפסיק את השימוש בו בעצי פרי נשירים בעtid הקרוב.

על פי הידע הקיים יפגעו הגידולים עניים למאכל, קיווי, אפרסק/נקטרינה באזוריים נמוכים ודובדבן ללא שימוש ב-HC. גם במינימ אחרים תיגרם פגעה משמעותית ברוחניות לפיכך נוצר צורך להשיק מעין מחקרי לפיתוח אלטרנטיבות בעלות יעילות דומה ל-HC. בהתאם נבחנו מספר חלופות ל HC במספר מניני נשירים הכלולים: תפוח, קיווי, אגס, אפרסק ודובדבן במשך 3 שנים. תכננתנו זו לא עוסקת בגפן ומתרכזת במגוון מיני עצי הפרי הנשירים.

יעד תכנית המחקר היה - פיתוח פרוטוקול לשבירת תרדמת הדומה ביעילותו ל- HC על ידי שימוש בחומרים מורשים, תוך עדיפות לחומרם שיטוכו פסילתם בעtid נמוכים.

תיאור המחקר - במהלך המחקר נבחנה סדרת חומרים מורשים המבוססים על דשן חנקני, דינוקאף, שמנים, משטחים מחדרים וציטוקינינים (BA, CPPU ו TDZ). בנוסף נבחנו מספר טיפולים טרומם תרדמת במטרה להפחית את שעת הצינון וטיפולו הפחתת התחרמות בחורף על ידי הצללה.

שיטות וחומרים - הניסויים נערכו באזוריים בהם אין צבירה מספקת של מנות צינון: אגס – קוסטיה בראש פינה ויונתן, דובדבן – רויאל دون ובורלא במטעה יונתן, רמג"ש ויראן. תפוח – זהוב בפתחה, אפרסק – סולינג וסמר סנו – בזכרון יעקב ויונתן. נקטרינה – 222 ביבון. קיווי – היווארד במלכיה וברעם וקיווי – ברונו בשדה נחמה. הניסויים נעשו ברמת העזן



הבודד כאשר כל טיפול נבחן בפחות 6 הזרות (ענ' להזורה). ריסוס נעשה ברובים בנפח של 3 ליטר לענ'. בכל הזורה רוסס ענ' המדייה וחצי מהען השכן מכל צד על מנת לאפשר כסוי מלא.

בשלוש שנות הניסוי הראשונות, בכל ענ' סומנו ענפים ונספרו פקעים על כל ענף (סה"כ 200 פקעים לענ') ונעשה מעקב רציף אחר הפרמטרים הבאים: **אחוֹז פְּקֻעִים מִתְעוּרָרִים** – נספר על ידי מעקב שבועי וספרה של סה"כ הפקעים המתעוררים בכל שבוע. **משך פריחה** – בכל שבוע התבצע מעקב אחר הפקעים המסומנים וצוין מצב הפרחים על גבי התפרחת (סגורים, פתוחים, נשירת עלי כוורת). **קביעת דרגת עלווה** – בכל שבוע נבדק מצב העלים שחולקו לשולש רמות: פקע ירוק, פקע פתוח ועלים פרושים. **אחוֹז פֶּרֶחִים פָּגּוּמִים** – בשיא פריחה נבחנו 100 פרחים מכל ענ' לבחינת תקינות מורפולוגית (נווכחות שלולות ועמודי עלי). בדובדבן ואפרסק נספרו אחוֹז פירות תאומים לאחר חנטה. **אחוֹז חַנְתָּה** – סה"כ פרחים נספרו על גבי הפקעים המסומנים ולאחר נשירת יוני נבדק אחוֹז החנטה. בטיפולים מצטיניגים ברמת העז השלם נבדק גם יבול – כל ענ' נקטף בנפרד, היבול נשקל ומשקל 100 פירות לקביעת מספר פירות ממוצע. בנוסף לפרמטרים המתוארים מעל' נעשתה הערכה ויזואלית אחת לשבוע לפחות מועדシア הפריחה בענ' וניתן ציון לעצמת פריחה מ 1 – 5. בשנת הניסוי האחרונה הערכות פריחה, הערכות עלווה והערכותシア פריחה נעשו בהערכתה ויזואלית בלבד על ידי מעריך יחיד (משה עגיב). הערכות אלו היו בהתאם לנתחוני הספירה כפי שהתקבל בהשוואה בין הшибוט. בנוסף נאספו נתוני דלול ויבול.

בנייה דרך במהלך הממחקר

שנה א (2014) – בחינה ראשונית של תכشيرים ברמת העז הבודד ובחירה תכشيرים מועדףים להמשך המחקר.

שנה ב (2015) – בחינה נוספת של תכشيرים פוטנציאליים (mozlchim משנה קודמת) בהיקף גדול יותר (6 עצים להזורה) ובבחינה של תכشيرים חדשים.



שנה ג (2016) – בחינה ברמת העז במספר אזורי גידול ומעבר למודל חצי מסחרי במינים בהם נמצאו תכشيرים פוטנציאליים שהראו הצלחה בשנתיים הקודמות.

סיכום התוצאות.

- תוצאות מפורטות בנפרד לכל מין כאשר בכל מין מוצגות תוצאות רלוונטיות למחקר.
- תוצאות מוצגות בנפרד עבור שלוש שנים ניסוי הראשונות כאשר שנה ראשונה (2013) מומנה על ידי שולחנות המגדלים.
- תוצאות השנה الأخيرة לניסוי (2016) מוצגות בנפרד מאחר ובשנה זו איסוף הנתונים נעשה בהערכתה בלבד. בנוסף לשנה זו הרחכנו את שטхи הניסוי ברוב המינים ובחלקם בוצעו ניסויים בהיקף חצי מסחרי.

אגס:


באגס התקדנו בשלוש השנים הראשונות בזון קוסציה. טיפולים נתנו בשני אטרים: ראש פינה (2013 ו-2014) ויונתן (2015). סיכום התוצאות בשלוש שנים הניסוי הראשונות (איור 1) הראה כי בטיפולי השמנים התקבלו תוצאות טובות עבור דינוקאפ בשני מועדים ועבור פיקאפ המכיל תידיאזורון (Ron3). בדשנים נמצא כי אמון חנקתי בשני מועדים הוביל גם כן להתעדירות טובה (איור 1) אבל פגע בפריה (תוצאות לא מובאות). התעדירות בטיפול האמון חנקתי בשילוב עם TDZ וארמורבריק הייתה טובה מהביקורת ב-2014 ונמוכה ממנה ב-2015 שהיהה שנה קריה. יחד עם זאת טיפול זה לא פגע בתעדירות במעט יונtan הממוקם גבוה יותר ובאזור קר יותר ביחס לראש פינה (תוצאות לא מובאות).



איור 1: התעדירות פקעים כללית כל השנה.

כמאתיים פקעים על 20 ענפים נספרו וסומנו לפני תחילת התעוררות הפקעים נספרו הפקעים אחת לשבוע עד סיום התעוררות. אחוז פקעים מתעוררים חושב מסה"כ הפקעים. מרווחים ושגיאות תקן ברמת מובהקות ל 0.05 וחשו מ 4 או 5 חזרות. עץ זהורה. כל טיפול הדשנים נתנו בתוספת שטח ארמוררייך. עבר טיפולי הדשנים מוצגות תוצאות 2014 ו 2015 בלבד מאחר ולא הגיעו הארמוררייך בזמן. כחול: 2013, אדום: 2014, ירוק: 2015. (TDZ = תיזיאזורון, דינוקאף, דינו, + תכשיר שמן דיניטרו מיצר ע"י טריסיס, Ron 3 = שמן תיזיאזורון מיצר ע"י תפוז, דינו אולטרה= שמן דינו המכיל גם תיזיאזורון, ארמוררייך, משטה מהדר מיבוא מהולנד. א.ח. = אמון חנקתי).

בבחינה של מועד שיא פריחה נמצא בכל השנים ובשני אתרי הניסוי כי אמון חנקתי בשילוב עם TDZ הוביל להקדמה בפריחה של כשבועיים ביחס לטיפולים אחרים (תוצאות מובאות רק עבור ראש פינה 2014 כמייצגות). טיפול האמון חנקתי, הפיק אף המכיל ג"כ תיזיאזורון (Ron3) והתיפול המשחררי הובילו גם כן להקדמה בפריחה ביחס לביקורת הלא מרוססת. אם כי בטיפול הפיק אף הפריחה לא הייתה אחידה ונמשכה על פני שבועיים. יתר הטיפולים לא הובילו להקדמה כלל.



איור 2: מועד שיא הפריחה.

בכל שבוע החל מתיחילת התעוררות נספר מספר פקעי הפריחה וענפים המסומנים וצוין מצב הפרחים: פרחים סגורים, פרחים בשיא פריחה ופרחים לאחר נשירת עלי הכותרת. אחוז הפרחים הנמצאים בשיא פריחה חושב עבור כל מועד דיגום מסה"כ פקעי הפריחה. (לפרט הטיפולים, ראה איור 1)

שלוש שנים הניסוי הראשונות כללו מספר טיפולים רב (לא כל הטיפולים מובאים לעיל – פירוט הטיפולים המלא בדוחות קודמים). מכלל הטיפולים שנoso הוחלט להתמקד בשנת הניסוי 2016 במספר טיפולים כמפורט בטבלה 1. טיפולים נעשו בשני אתרי ניסוי. מטע ראש פינה (250 מטר גובה) ומטע יונתן (400 מטר גובה). טיפולים ניתנו במקביל.

טבלה 1: פירוט הטיפולים שניתנו בשנת 2016 באגס קוסציה בראש פינה ווונתן. בראש פינה היו 8 חזרות לכל טיפול (ע"ז לחזרה). ביוונתן היו 7 חזרות לכל טיפול (ע"ז לחזרה) בבלוקים באקראי.

מספר	טיפול	תכשירים	שיטה	מועד יישום	הערות
1	ביקורת	לא טיפול			
2	ביקורת מסחרית שני מועדים ציאנמיד חומציזי HC	אלזודף 3% אלזודף 0.5% אלזודף 3%	טריטון X 100 0.025% שמן לבן 80 3%	10.2 24.2	
3	TDZ	אמון חנקי נזולי 8% 100 TDZ (0.01%)	ארמוברייק 1%	10.2	מקדים פריהה כל השנים.
4	TDZ	אמון חנקי נזולי 8% 200 TDZ (0.02%)	ארמוברייק 1%	10.2	עליה ברייכו TDZ
5	TDZ	אמון חנקי נזולי 8% 300 TDZ (0.03%)	ארמוברייק 1%	10.2	עליה ברייכו TDZ
6	TDZ + שמן דינו שני מועדים	אמון חנקי נזולי 8% 100 TDZ (0.01%) מועד ראשון שמן דינו 5% מועד שני	ארמוברייק 1%	10.2 24.2	התערורות אגרסיבית.
7	דינוקאפ שני מועדים	דינו 15 נזולי 7.5% מועד ראשון 5% מועד שני		10.2 24.2	היה מוצלח בשנים קודמות והקדמים פריהה
8	TDZ ודינוקאפ שני מועדים	דינו 15 נזולי + 3% 200 TDZ (0.02%) ח"מ		10.2 24.2	מושלח במשר שנתיים
9	תפוזל	(Ron3) 4%	פיק אפ	10.2	מושלח במשר 3% זירקון
10	תריס	динואולטרה 5 4%		10.2	

בנוסף לקוסציה נבחנו מספר טיפולים גם בזון ספdone בראש פינה (טבלה 2). לzn זה דרישות קור פחותות ביחס לקוסציה ולכן נהוג טיפול התערורות יחד במועד הטיפול השני בקוסציה. בנוסף טיפול התערורות בזון זה ניתנים באזור ראש פינה ואילו באזור יונתן גמנים החקלאים מיישום טיפול התערורות בזון זה.


טבלה 2: פירוט הטיפולים שניתנו בשנת 2016 באגס ספונה בראש פינה. 8 הזורות לכל טיפול (ען לחזרה) בבלוקים באקראי.

מספר	טיפול	תכשירים	שפתה	מועד יישום
1	ביקורת	לא טיפול		
2	ביקורת מסחרית ציאנמיך חומצי HC	אלזודף 0.5%	טריטון X 100 0.025% שמן לבן 80 3%	25.2
3	אמון הנקתי	אמון הנקתי נוזלי 8%	ארמוברייק 1%	25.2
4	דינוקאפ	דינו 15 נוזלי 3%		25.2
5	דינוקאפ	דינו 15 נוזלי 5%		25.2
6	תפוזל	פיק אפ 4%	3% זירקון	25.2
7	תרסיס	динואולטרה 5 4%		25.2

שעות הקור שנצברו היו: 560 שעות עד למועד הריסוס הראשון ו 580 עד למועד הריסוס השני ביונתן. 540 עד למועד הריסוס הראשון ו 560 עד למועד הריסוס השני בראש פינה.

כאמור הערכות עצמת פריהה ועצמת עלולה במועד שיא הפריהה נבדקו בשני השטחים. נמצא כי עצמת העלווה הייתה טוביה מטיפול הביקורת בכל הטיפולים שניתנו. הבדלים קטנים בעצמה נראו בין טיפול הדשנים לבין טיפול השמנים כאשר בכלל בטיפול השמנים (פיק אפ, דינוקאפ ודינואולטרה), עצמת העלווה גבוהה יותר (איור 3A). עצמת הפריהה מאידך השתנתה בין השטחים. ביונtan נראהתה עצמת פריהה נמוכה יחסית כאשר בכל הטיפולים למעט טיפול 3.6TDZ עצמת העלווה הייתה גבוהה מעצמת הביקורת. הטיפול הטוב ביותר עם עצמת פריהה של TDZ היה טיפול הדינוקאפ בשילוב עם TDZ (איור 3B). בראש פינה נמצא כי הטיפול הטוב ביותר היה טיפול הביקורת שהייתה בעצמת פריהה של 4. הבדלים בין עצמות הפריהה נובעים מבנה העצם. בעוד שביוניtan המטע ותיק והעצים גדולים בראש פינה העצים קטנים יחסית ולכך עצמת הפריהה גבוהה. טיפולים נוספים שלא נבדלו מטיפול הביקורת היו א. חנקתי TDZ, 100TDZ, דינואולטרה ודינוקאפ + TDZ. ביתר הטיפולים עצמת הפריהה הייתה נמוכה מהביקורת, תופעה המעידת על פגיעה אפשרית בפרחים של חומרים אלו.

A



איור 3: עצמת עלולה ופריחה בזון קוסציה.

עצמת עלולה (3A) נעשתה בהערכתה ויוזאלית במהלך הפריחה. הערכה נעשתה בסולם של 0 – 3. 0 – אין עלולה כלל. 3 – עלולה מלאה ועלים פרושים. עצמת פריחה (3B) נעשתה גם כן בשיא פריחה בהערכתה ויוזאלית במהלך התעוררות. מועדשיא פריחה נקבע בהתאם למצב הפריחה כל הפרחים פתוחים. הערכות נעשו על ידי מעריך יחיד בכמה מודדים במהלך התעוררות. מועדשיא פריחה נקבע ברמת הפריחה על העין ותחילת נשירה עלי כוורת ועצמת פריחה ועלולה במועד זה לשימוש לחישובי הממוצעים. ממוצעים וקווי שגיאות תקן ברמת מובחנות של 0.05 מציינים באוויר וחושבו בראש פינה מ 8 הזרות ובינונן מ 7 הזרות בכלוקים באקריא (עץ להזרה). קו כחול מייצג ממוצע ביקורת ביונtan וקו אדום ממוצע ביקורת בראש פינה.


מועדשיא פריחה נקבע גם הוא בהערכתה חזותית (טבלה 3). במהלך התעוררות ופתיחה הפרחים נערכו מספר תצפיות חזותיות לקבעת המועד המדוקיק. השוואות בין מועד פריחה בהערכתה לבין מועדשיא פריחה בספירות נעשו במהלך 2015 ונמצאה חפיפה בין שתי השיטות. נמצא כי בדומה לשנים קודמות טיפול האמון חנקי בשילוב עם TDZ הובילו להקדמה בפריחה בין אם ניתנו בלבד ובין אם בשילוב עם שמן דינגו. יתר הטיפולים לא נבדלו מטיפול הביקורת במועדשיא הפריחה.

טבלה 3: מועד שייא הפריהה בזון קוסטיה.

מועד שייא הפריהה נקבע בהערכתה חזותית במהלך התעוררות. מועד נקבע על ידי מעריך יחיד (משה עגיב) עבור כל עץ בנפרד. ממצאים עבור כל טיפול מצוינים בטבלה.

טיפול	מועד שייא הפריהה בראש פינה	מועד שייא הפריהה ביוונון	מועד שייא הפריהה בראש פינה
A. חנקתי + TDZ-100	8/3	9/3	
A. חנקתי + TDZ-200	9/3	9/3	
A. חנקתי + TDZ-300	8/3	9/3	
אלזודף	14/3	12/3	
אמון חנקתי / TDZ + שמן דינו	10/3	9/3	
ביקורת	15/3	14/3	
динואולטרא 5	13/3	13/3	
динוקאפ	13/3	12/3	
динוקאפ TDZ +	13/3	13/3	
פיק אפ (תפוזל)	13/3	13/3	

בזון ספdone בראש פינה נמצא כי עצמת העלווה לא נבדלה בטיפולים השונים מטיפול הביקורת למעט טיפול הדינואולטרא 5 בו עצמת העלווה נמוכה במובהק (איור 4). בנוסף נמצא כי עצמת הפריהה לא נבדלה במובהק בין הטיפולים כאשר טיפול הדינואולטרא 5 והдинוקאפ 3% הראו מגמת שיפור בעצמה ביחס לביקורת ולטיפול המשקי באלוודף.



איור 4: עצמת עלולה ופריחה בזון ספdone.

עצמת עלולה (אדום) ועצמת פריחה (כחול) נעשתה כמפורט באירור 3. ממציעים וקווי שגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 מצוינים באירור וחושבו מ 8 חזרות (ען להזורה). קו כחול מייצג ממוצע עצמת פריחה בביבורת וקו אדום מייצג ממוצע עצמת עלולה בביבורת.


מועדシア פריחה בזון ספdone נקבע גם כן בהערכתה חזותית (טבלה 4). לא נמצא הבדלים במועד בין הטיפולים השונים לביבורת.

טבלה 4: מועדシア פריחה בזון ספdone.

מועדシア פריחה נקבע בהערכתה חזותית במהלך התוצאות. מועד נקבע על ידי מערך יחיד (משה עגב) עבר על ען בנפרד. ממציעים עברו כל טיפול מצוינים בטבלה.

טיפול	מועדシア פריחה
א.חנקתי	15/3
אלזודף	14/3
ביבורת	14/3
динואולטרא 5	14/3
динוקאפ 3%	14/3
динוקאפ 5%	14/3
פיק אפ (תפוז)	14/3


לאחר חנטה בווצע דילול יدني על ידי המשק. ספירה של החנטים המдолלים בכל ען מראה כי ישנים הבדלים מהותיים בין אחוז החנטה בראש פינה לאחزو החנטה ביוונתן. בעוד שעצמת הפריחה בראש פינה הייתה טובת מעצמת הפריחה ביוונתן ברוב הטיפולים ובביבורת בפרט, מספר החנטים שadolלו בראש פינה היה קטן משמעותית (איור 5). זאת כאמור בשל ההבדלים בגודל העצים. בהשוואה בין הטיפולים השונים נמצא כי בעוד שבראש פינה לא נמצא הבדלים בין הטיפולים השונים בזנים קוסציה וספdone, ביוונתן מספר החנטים שadolלו היה קטן במובhawk מהביבורת בטיפול האמון חנקתי 300TDZ. בטיפול האמון חנקתי בשילוב עם דינו והפיק אפ (המכל גם תידיאזורון) שנitin בשלילוב עם זירקון (דשן חנקתי בהמלצת החברה) נראה גם ירידה במספר החנטים המдолלים לען אם כי לא במובhawk. מסתמן שתידיאזורון מקטין את מספר החנטים לען בזון קוסציה. יתרון והקדמת הפריחה חזקה למועד שקדם לספdone בהשפעת חומר זה גרמה לכך.



איור 5: מספר החניטים המודולרים בון קוסציה.

מספר החניטים שודלו על ידי המשק נספרו במהלך הדילול ביונטן (כחול) ובראש פינה (אדום). ממצאים ושגיאות תקין כמפורט באיור 3.

בקטיף נשקל היבול בכל חזרה בכל חלקה (איור 6). נמצא כי ככל היבול דומה בשתי החלקות. זאת בשל הדילול המסייע שנעשה ביונטן. בהשוואה בין הטיפולים השונים נראה כי בעוד שבראש פינה הגבוה ביותר אם כי לא במובhawk היה בטיפולי האמון חנקתי בשילוב עם 100TDZ ו 200TDZ, ביונטן הטיפול הטוב ביותר היה הטיפול המשקי באלווזוף. טיפול זה היה גבוה במובhawk מטיפולי האמון חנקתי בהם היבול היה נמוך גם מטיפול הביקורת. טיפולים השמנים לא נבדלו במובhawk מטיפול האלווזוף ביונטן ובראש פינה. יש לציין כי נבדק המשקל בלבד ולא מספר הפירות.




איור 6:

יבול ממוצע בון קוסציה:

בזמן הקטיף המשקי נשקל היבול בכל חזרה בשתי החלקות הנבחנות: ראה פינה (כחול) וyonatan (אדום). ממצאים ושגיאות תקין חישבו כמפורט באיור 3. קווים מייצגים ממוצע בvikorot.

בון ספdone (איור 7) נמצא כי טיפול הדינוקאפ 3% היה הטוב ביותר כאשר יבול טיפול האלווזוף המשקי, טיפול הפיק אפ וטיפול הדינוואולטרא היה נמוך מיבול הביקורת.



איור 7: יבול ממוצע בין ספdone:

בזמן הקטיף המשקי נשקל היבול בכל חורה בראש פינה. ממוצעים ושגיאות תקן חושבו כמפורט באירור 4.

סיכום:


מסיכום הנתונים נראה כי בין קוסציה טיפול האמון חנקי בשילוב עם TDZ מקדים את מועד שיא הפריחה. בשנת הניסוי הנוכחית מועד פריחה זה הקדים את מועד פריחת הzon ספdone בשני אתרי הניסוי. הקדמה זו היא הסיבה המרכזית לריסוס עצי הקוסציה בשוביי תרזרמה כדי לאפשר FAGISH פריחה עם הzon המרכזי ספdone. מайдך בשנת 2015 חפיפה מלאה בין הונים התקבלה בעצים שרוססו בטיפול זה. לחפית הונים משמעותית ברמת ההפריה המשפיעה הן על רמת החנתה והן על גודל הפרי (כתוצאה מספר הזורעים). מכאן שעיטוי הריסוס של קוסציה חייב להיות מותנה במידה צבירת הקור באחת השנה. יתרו והירידה ביבול טיפול החנקן ביונתן מקורם בהפריה פחותה ובמספר זורעים נמוך שהוביל לירידה בגודל הפרי. לאחר ולא נבדק מספר הזורעים בקטיף הנחה זו היא בגדר השערה בלבד. בהשוואה בין החלקות השונות נראה כי הון טיפול האמון חנקי TDZ 100TDZ והן טיפול השמנים הובילו לשיפור בהतעוררות העולה והפריה ביחס לביקורת. יחד עם זאת טיפול הפיק אפ בשילוב עם זירקון פגע עצמת הפריחה בראש פינה. הירידה בספרית הדל ביונתן טיפול הפיק אפ וטיפול האמון חנקי TDZ 300TDZ מרמזות על פגיעה באחיזה החנתה (בפיק אפ ירידת זו נובעת גם מירידה עצמת הפריחה). אפקט זה על החנתה אינו שלילי בהכרח ועשוי להוביל לשיפור בתשובות הדילול. בין ספdone נמצא טיפול הפיק אפ דינוקאפ% 3% ו 5% היה מיטבי הן ברמת התתעוררות והן ברמת היבול גם מהטיפול המשקי. לאחר והטיפול הכפול בדינוקאפ בין קוסציה היה זהה לטיפול המשקי נראה כי טיפול זה עדיפות גבוהה כחלופה לאלווזוף. זאת לאחר וטיפול שני בין קוסציה נעשה במקביל לטיפול הטיפול התתעוררות הניתן לספdone. ריסוס אחד של השטחים בדינוקאפ 5% יכול על החקלאים. טיפול ייחיד בין קוסציה באמון חנקי בשילוב עם TDZ, טיפול הפיק אפ או בדינו אולטרא הראה תוצאות חיוביות. אי לכך נראה כי טיפול ייחיד בתכשירים אלו בין קוסציה עשוי גם להוות תחליף ראוי לשימוש באלווזוף (ציאנמיך חומצי). יחד עם זאת טיפולים אלו אינם מתאימים לספdone ועשויים לפגוע ביבול. בהקשר זה יש לציין כי השימוש בין ה TDZ לחנקן עשוי לפגוע בפריחה

ובחננהה. מאחר ולטיפול זה פוטנציאל כمدלן יש לבדוק את יישום החומריים המשלבים תכשירים אלו גם בהקשר זה. בנוסף הקדמת הפריחה בא. חנקתי TDZ עשויה לאפשר מפגש זנים טוב בשנים קרות ולפגוע במפגש בשנים חמורות יותר. יש על כן לבדוק יישום תכשיר זה בשנים שונות על מנת לקבוע פרוטוקול יישום מיטבי.

מסיקום הנתונים לעיל נראה כי יש בידנו מספר חלופות לציאנמיז חומציז באגס ויש להמשיך ולבחון חלופות אלו ברמה חצי מסחרית במספר אזורי גידול.


תפוח:

משיכום 3 שנות המחקה הראשונות נמצא כי בטיפול השמנים אחוז התעווררות סופי ב-2013 היה נמוך בכל הטיפולים מהטיפול המשחררי. מאידך ב-2014 נמצא כי דינוקאף בריכוז 7.5% דינוקאף בשילוב עם בונגרו (ציטוקנן BA) ושמן לבן בשילוב עם TDZ (נבדק בנפרד וככתשיר מסחרי פיקאף Ron3) המכיל גם הוא שמן לבן ו-TDZ (הראוי תוצאות שאינן נבדלות מטיפול הביקורת). ב-2015 נושא רק Ron3 ונמצא כי גם בשנה זו אחוז התעווררות היה דומה לטיפול המשחררי. בטיפול החדשנים נמצא כי בכל הטיפולים בהם היה שימוש של אמון חנקתי + ארמוברייק האחוז התעווררות היה גבוה או שווה לטיפול המשחררי למעט גפרת האמון. תוצאות אלו מרמזות כי החומר הפעיל בתעווררות הוא החנקה.



אייר 8: התעווררות פקעים כללית כל השנים. כחול: 2013, אדום: 2014, ירוק: 2015. (לגביו טיפולים ראה אייר 1. וכן: טיפול מסחרי שמן לבן + אלזודה Ron3 ניתן ב-4%. דינו BA = בנזיל אדניון בריכוז 500 ח'ם ג'ט 3%. שמן לבן 3% TDZ 100 ח'ם. ניצן בוסטר ג.א. = גפרת אמון 2.5%. כל טיפול החדשנים ניתנו בתוספת ארמוברייק 1% כמשטה).

בבחינה של אחוז התעווררות פקעי הפריה (תוצאות מוגדרות רק עבור 2014 ו-2015 יפתח) נמצא כי ב-2014 ו-2015 לא פגע טיפול Ron3 בפרחים. ב-2014 פגעו בפרחים טיפול דינוקאף 5% מאוחר ו-7.5% מוקדם אם כי האחרון לא באופן מובהק. בדשנים נראהתה פגיעה באמון חנקתי 10% ובאמון חנקתי בשילוב עם TDZ ב-2014 ובאמון חנקתי וטיפול Ron3 הניצן ב-2015. יש לציין כי הפגיעה בפרחים נמוכה מאוד ולא בהכרח מצביעה על סיכון בשימוש בחומרים. יתרון ופגיעה זו עדיפה מאוחר ויש דילול פריה שנעשה בכל מקרה בשלבים מאוחרים יותר.



איור 9: התעוורנות פקעי פרייה 2014 ו-2015. אדום: 2014, ירוק: 2015. (חמרם וריכוזים ראה איור 9)


בבחינה של פקעי הפריה, נמצא כי טיפול הדינוקאף הרao התעוורנות טובעה של פקעי צמיחה אבל פגעו בתתעוורנות פקעי פרייה. בנוסף טיפולים אלו לא הובילו להתקדמה בפרייה. מאידך טיפול הדשנים והחומר פיק אפ (Ron3) של חברת תפוזל נמצאו כמעורדים טובים במיוחד לטיפול המשקי. טיפול הדשן גם הקדימו פרייה ביחס לטיפול המשקי. יש לציין כי ב-2014 אמונה חנקתי בריכוזו של 10% פגע בפרייה ויש להיזהר מריכוזו חנקה גבוהה מדי ביחס.

ב-2016 נבחנו הטיפולים הנבחרים בחלוקת ניסויי בפתח ובמספר חלקיות מודל באזורי גידול שונים. בנוסף נבחנו מספר טיפולים בעצים צעירים בחותם מתהיהם. זאת מאחר ודרישות הקור של עצים צעירים גבוהות מאוד ביחס לעצים בוגרים.

טבלה 5: פירוט הטיפולים שניתנו בשנת 2016 בתפוצה זחוח בוגר בפתחה ובגרני סמיוט צעירים בחווות מתחיהו. בפתחה היו 10 חזרות לכל טיפול (ע"ז לחזרה). ובחווות מתחיהו 5 חזרות לכל טיפול (ע"ז לחזרה) בבלוקים באקראי.

מספר	טיפול	טיפולים	שנה	בוגרים\צעירים גיל 2 -	מועד יישום	הערות
1	ביקורת	לא טיפול		4	רף בבוגרים	
2	ביקורת מסחרית	אלזודף 0.5%	80%	10.3 20.2	זמן לבן 3%	
3	אמון חנקתי	אמון חנקתי נזולי 6%		20.2	ארמובירייק 1%	בדיקות גם במודלים
4	אמון חנקתי ו TDZ	אמון חנקתי נזולי 6% (0.01%) 100 TDZ		20.2	ארמובירייק 1%	מוצלח בבוגרים אבל פגע בפוריות ב 2014 לא רלוונטי לצעירים.
5	אמון חנקתי ו TDZ	אמון חנקתי נזולי 6% (0.02%) 200 TDZ		10.3	ארמובירייק 1%	עליה ב TDZ להגברת התעוורות בעצירים.
6	אמון חנקתי ו TDZ	אמון חנקתי נזולי 6% (0.03%) 300 TDZ		10.3	ארמובירייק 1%	עליה נספתה בריכוזו TDZ.
7	חנקת אשלגן	חנקת אשלגן 6.7%	gram לליטר	20.2	ארמובירייק 1%	חנקה לא אמון היה מוצלח ב 2014. ב 2015 התעוורות פחותה טוביה. שווה בדיקה בגליל ייעילות הובלה.
8	חנקת אשלגן	חנקת אשלגן 10%	gram לליטר	20.2	ארמובירייק 1%	עליה בחנקה.
9	חנקת אשלגן	חנקת אשלגן 4%	gram לליטר	20.2	ארמובירייק 1%	
10	תרסיס	динו אולטרא 5%		20.2		לא נספה
11	בלופרינס	חומר אטליקי		20.2	ארמובירייק 1%	בלופרינס מועד מאוחר היה מוצלח
12	תפוזול	פיק אפ 4%		10.3 20.2	2%	הראה תוצאות טובות שנתיים
14	תרסיס	динואולטרא 1.5%		10.3		динואולטרא ב 70 ח"מ

בבחינה של עצמת הפריחה ועוצמת העלווה נמצאו כי בכל הטיפולים עצמת העלווה הייתה גבוהה מבביקורת בМОבק. כאשר טיפול האמון חנקתי + TDZ + עצמת התעוורות העלווה הייתה גבוהה ביותר. גם בבחינה של עצמת הפריחה נמצא כי כל הטיפולים שיפרו את הפריחה ביחס לביקורת. יחד עם זאת טיפול האמון חנקתי, אמון חנקתי + TDZ + טיפול האלזודף, לא נבדלו מהביקורת בМОבק. יש לציין שעצמת הפריחה במטע הייתה מאוד נמוכה.




איור 10: עוצמת עולה ופריחה בתפוח זהוב.

עוצמת עולה ופריחה נעשו בהערכתה וויזואלית במהלך שיא הפריחה. הערכת עולה נעשתה בסולם של 0 – 3. – אין עולה כלל. 3 – עולה מלאה ועלים פרושים. הערכת פריחה נעשתה בסולם של 0 – 5. – אין פריחה כלל. 5 – פריחה מלאה כל הפרחים פתווחים. הערכות נעשו על ידי מעריך יחיד בכמה מודדים במהלך התעורות. מועד שיא פריחה נקבע בהתאם למצב הפריחה על העץ ותחלת נשירת עלי כותרת ועוצמת פריחה ועולה במועד זה שימוש לחישובי הממוצעים. ממוצעים וסטיות תקן ברמת מובהקות של 0.05 מצוינים באורו והושבו מ 10 הזרות בבלוקים באקראי (ענץ להזורה). קו כחול מייצג ממוצע של עוצמת הפריחה בביטחון וקו אדום ממוצע של עמת העולה בביטחון.

מועד שיא הפריחה לא נבדל בין הטיפולים ובין הביקורת. זאת בניגוד לתוצאות השנהו הקודמות בהן טיפול הביקורת פרה מאוחר ביחס לטיפולים הנבחנים.


מספר החניטים שدولלו היה גבוה בכל הטיפולים מהביקורת למעט טיפול האמון חנקתי והבלופרינס. מספר החניטים היה גבוה בטיפול האמון חנקתי + TDZ וטיפול הדיניאולטרא 1.5. נתונים אלו מרמזים על אחוז חנטה גבוהה בטיפולים אלו.



איור 11: מספר החניטים המдолלים בתפוח זהוב (טיפולים ראה איורים 9, 10)

מספר החניטים שدولלו על ידי המשק נספרו במהלך הדילול בראש פינה. ממוצעים וסטיות תקן כמפורט באיור 7.

czefoi ybole le'uz hia nmo'ak ma'od be'kol htipolim. ychad um zat mmotz'u hibbol hia goba be'kol htipolim b'ihes libikora. hbedlim biin htipolim ha'shoniim ainim mohbekim v'kutnim.



איור 12: יבול ממוצע לעץ תפוח זהוב.

יבול ממוצע לעץ בטיפולים השונים. ממוצעים ושגיאות תקן כמפורט באירור 7.

סיכון הנתונים שהתקבלו מחלוקת הניסוי מלמד כי כל החומרים שנוסו מושפרים התעווררות ויבול ביחס לביקורת שאינה מרוססת ואינם נבדלים מטיפול האלוזוף המשקי. לאחר רמת הפוריות בחלוקת שנבדקה נמוכה מאוד קשה לקבוע האם היו נזקים. היות וחומרים אלו נוטו גם בשנים קודומות בהצלחה נראה כי השימוש בתכשירים השונים בטוח ולא צפוי נזק משמעותי בשימוש נרחב בהם.מעט בדיינו שהראה פוטנציאלית פגיעה בפריחה בשנים קודומות. בהתאם נראה כי ניתן לבדוק את החומרים השונים בשטחים מסחריים. יש לציין שהיבול בתפה נקבע לפי מצב הדרבנות נושא הפרחים שעל העץ. התעווררות פקעים וGETTYIVIM טובה תיזור יותר דרבנות לעתיד. כך יש צורך בעקבות רב שנתי אחרי טיפולים חוזרים של אותו תכשיר על אותם העצים למוד על ההשפעה הרוב שנתית של כל תכשיר.

במקביל לניסוי העצים נבחנו כמה תכשירים שונים קודמות גם בשטחי מודל. שטחי המודל היו בשטח של 5 דונם וככלו שטחים מכמה אזורי גידול שונים. בכל שטח מודל נבנו כמה זנים ונבדק היבול לדונם. פירוט התוצאות בטבלאות 6 – 8.

טבלה 7: מודל לבחינת חלופות לאלווזדף בשמורה בגליל העליון.

יבול ק"ג/יום	ז'	טיפול
5700	זהוב	דינו 5% אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
4800	זהוב	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
5200	זהוב	דינו אולטרא 5%
5200	זהוב	פיקאפ 4%
3700	גalfa	דינו 5% אלוזדף 0.5% (טיפול משקי) גalfa
3500	גalfa	פיקאפ 4%


יבול ק"ג/יום	ז'	טיפול
5868	זהוב	וינטרזול 5% + אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
5159	סטרקיניג	וינטרזול 5% + אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
7366	אורלינס	וינטרזול 5% + אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
6623	זהוב	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
6329	סטרקיניג	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
7629	אורלינס	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
8415	זהוב	TDZ 100+ 1% + ארמו ברק
7629	סטרקיניג	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
8476	אורלינס	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%

טבלה 8: מודל לבחינת חלופות לאלווזדף בחוות מתחיה בגליל.

יבול ק"ג/יום	ז'	שורות	טיפול
6400	זהוב	12	דינו 5% אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
4800	זהוב	12	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1%
5000	זהוב	6	דינו 5% אלוזדף 0.5% (טיפול משקי)
5100	זהוב	6	אמון חנקתי 6% + ארמו ברק 1% + TDZ

התוצאות שהתקבלו מצבייעות על כך טיפול האמון חנקתי 6% + ארמו בריך לא היה מספיק חזק והוביל לפחיתה ביבול ביונתן ומתחיה. בשומרה מכך טיפול זה היה טוב מטיפול האלווזדף המשקי. מכך טיפול האמון חנקתי בתוספת TDZ היה טוב מהטיפול המשקי בכל הזרנים ובכל המקומות בהם נסעה שילוב זה. נראה על כן כי בנגוד לתוצאות שהתקבלו בפתח בעצמי המודל טיפול זה טוב מהטיפול באמון חנקתי בלבד. בנוסף נמצא כי גם טיפול הפיק אפ וגמ טיפול הדינו אולטרא היו טובים מטיפול האמון חנקתי ושווים לטיפול האלווזדף המשקי. על מנת לגבש המלצות לחקלאים, יש לזכור על ניסיונות אלו במשך 2 שנים נוספות.

ב尤וד שבעצים בוגרים דרישות הצינון מתונות יחסית בתפות, בעצים צעירים דרישות הצינון גבוהות. בהתאם התעווררות הפקעים בעיצוב הצרי בעצים צעירים נמוכה. בשנת הניסוי הנוכחית נבדקו מספר חומרים על עצים צעירים בני שנתיים בזן גרני סמייט מתחתות מתתיהו. נמצא כי כל הטיפולים הובילו להtauוררות שאינה נבדלת מהטיפול המשקי בלבד. הטיפול בדינואולטרא 1.5% המשלב TDZ ברכיבו גבוה היה הטוב ביותר והוביל ל 30% התעווררות של הפקעים.



אייר 13: אחוז פקעים מtauוררים בעצים בני שנתיים בזן גרני סמייט.


כ 80 פקעים סומנו על כל עץ ומעקב אחר אחוז הפקעים המtauוררים נעשה אחת לשבוע עד סיום התעווררות. מועד רישום העצים היה ב 10.3. ממצאים ושגיאות תקין חושבו על פי 5 חזרות לכל טיפול (ע"ז להזורה).

סיכום:

סיכום הנתונים משנהו הניסוי מראה כי יש בידנו מספר חלופות לאלווזוף בתפות. הן הדשנים החנקניים בשילוב עם ארמוברייק כמשטח והן השמנים דינואולטרא ופיק אפ המשלבים את הציטוקנין TDZ משבירים התעווררות ביחס לביקורת לא מרוססת ואינם נבדלים מהטיפול המשקי. יש לציין כי האמון חנקתי ללא ה TDZ לא עבד טוב בניסיונות המודלים. ניתן שיש להעלות את ריכזו הדשן על מנת לקבל התעווררות טובה. טיפול שדה שנעשה על ידי החברה נמצא כי חנקן ברכיבו של 12% היה טוב מישום בריכוזים נמוכים יותר. ניסיונות אלו נעשו באזור שומרה. ניתן כי בחנקן בלבד לחומרים אחרים יש להעלות את ריכזו הדשן ככל שנצברו יותר שעות קור. בנוסף נמצא כי בעצים צעירים הן טיפול הנקן בשילוב עם TDZ והן טיפול השמנים בתוספת TDZ הובילו להtauוררות מספקת. טיפול הדינואולטרא 1.5 היה הטוב ביותר. לאחר מכן חשש מגיעה בפרחים בעצים אלו שימוש בחומר זה בעצים צעירים מסתמן כחלופה הטובה ביותר לאלווזוף במתעים צעירים. בשנים הבאות יש להמשיך ולבחון את התכשיטים פיק אפ, דינואולטרא 5, אמון חנקתי ואמון חנקתי בתוספת TDZ במספר גדול של שטחי מודל על מנת לפתח פרוטוקול יישום לכל אזור וכן להמשיך ולבחון אותם טיפולים על אותם העצים משך עוד שנתיים נוספת.


אפרסק ונקטרינה:

בשנת 2015 נבדקו מספר חומרים בין סולינג בזיכרון יעקב. תוצאות התעוררות הפקעים הראו הטיפול המשקי לא נבדל טיפול הביקורת. יחד עם זאת טיפול האמון חנקתי המאוחר הוביל לעלייה באחוזו התעוררות הכללי ואילו טיפול ה TDZ וטיפול הדינואולטרא פגע באחוזו הפקעים המתעוררים.



איור 14: אחוז התעוררות פקעי פריחה לאחר סיום התעוררות. כל טיפול חדש ניתן בתוספת ארמוברייך 1%. אלזודף = 0.2% בתוספת דינו 5.5%. דינו שני מועדים – דינו 5.5%TDZ – אמון חנקתי 6%TDZ 100 ח"מ. א.ח TDZ שני מועדים – אמון חנקתי 6% מוקדים דינו 100TDZ ח"מ מאוחר.

בבחינה של מועד שייא הפריחה נמצא כי טיפול הדינואולטרא 5% ו 2.5%, אלזודף, דינו 2 מועדים, אמון חנקתי מוקדם ו 10%, ניצן 2% אקטיב ואמון חנקתי עם TDZ הקדימו לפרוחה ביחס לביקורת הלא מרוססת ולטיפול האמון חנקתי המאוחרים.



איור 15: אחוז פרחים בשיא פריחה לארוך תקופה הניטוי. פרחים בשיא פריחה נספרו אחת לשבוע וחשב אחוזו הפרחים הפורחים עברו כל נקודת ספירה. טיפולים כמפורט באיור 14.

מסיכום התוצאות נראה כי רוב הטיפולים הובילו להתעוררות טובה ולהקדמה בפריחה. טיפול האמון חנקי בשילוב עם TDZ הקדים להטערר ולפרוחה. נראה על כן כי לטיפול זה פוטנציאל טוב כמקדים מאוחר וטיפול זה הוביל לירידה באחזוי החנkteה כפי שהתקבל מהתוצאות הדلال נראה כי לטיפול זה פוטנציאל לשימוש גם כמדללי כימי. אי לכך נראה כי פוטנציאל השימוש באמון חנקי + TDZ באפרסק גבוה.


בשנת המחקה הנוכחית נבדקו מספר תכשירים בין הנקטרינה המקדים 222 ובין האפרסק המאוחר סמר סנו. טיפולים נעשו במושב יינון במשך של דן גROLLה. פירוט הטיפולים ומועד היישום בטבלה 9.

טבלה 9: פירוט הטיפולים שניתנו בשנת 2016 בנקטרינה 222 ובאפרסק סמר סנו ביבנו. בנקטרינה 222 ניתנו 6 חזרות לכל טיפול (ע"ז לחזרה) בבלוקים באקראי ואילו בסמר סנו 4 חזרות לכל טיפול.

מספר	טיפול	חומר	טchniques	שטח	מועד יישום סмар סנו	הערות
1	ביקורת	לא טיפול				
2	ביקורת מסחרית	דינוקאפ 5% + אלוזדר 0.2% 0.25%			5.12 10.2	
3	אמון חנקי ו TDZ	אמון חנקי נזולי 6% + בסמר סנו 4% (0.01%) 100 ח"מ TDZ	ארמוברייק 1%		5.12 10.2	היה מוצלח ב 2014 ו 2015
4	אמון חנקי	אמון חנקי נזולי 6%	ארמוברייק 1%		5.12 10.2	נראה סביר ב 2014
5	אמון חנקי	אמון חנקי נזולי 10% רק ב 222	ארמוברייק 1%		5.12	נראה סביר ב 2014
6	תרסיס	динואולטרא 4%			5.12 10.2	היה מוצלח ב 2014
7	תפוזל	פיק אפ 4%			5.12 10.2	לא נסה באפרסק אצלנו אבל היה מוצלח בתפה והראת תוצאות טובות מאוד במקרים של תפוזל בכרם מהר"ל.
8	גנ מור	ניצן אקטיב 2%		ניצן בוסטר 8%	10.2	פרישה באמצעות נובמבר
	גניגר	רשת שחורה 80%				

תוצאות נקטרינה 222:

הערכות עצמת פריהה ועלולה נעשו אחת לשבוע החל מהתחלת התעווררות על ידי מעריך יחיד. עצמת פריהה ועלולה במועדシア הפריהה מוצגות באירור 16. עצמת הפריהה לא נבדלה בין הטיפולים למעט טיפול החנקן + TDZ שפגע בפריהה. עצמת העלולה בשיא הפריהה גם כן לא נבדלה בין הטיפולים למעט טיפול החנקן + TDZ שהראה התעווררות עלולה חזקה.




אייר 16: עצמת פריהה ועלולה בזון 222.

עצמת פריהה ועלולה נערך על ידי מעריך יחיד. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 חושבו מ 6 חזרות לטיפול (ע"ז לחורה). בערכות של מועדシア הפריהה (טבלה 10) נמצא כי עצם שטופלו באמון חנקתי בלבד ועם TDZ פרחו קודם מאשר גם פיק אפ ודינואולטרא פרחו לפני טיפול האלווזדר והביקורת.

טבלה 10: מועדシア הפריהה בנקטרינה 222 ביבנו.

מועדシア פריהה	טיפול
12/2	אלוזדר
13/2	ביקורת
6/2	אמון חנקתי 6%
5/2	אמון חנקתי 10%
3/2	TDZ
6/2	דינואולטרא
7/2	פיקאפ


קטיף מסחרי נעשה בשני מועדים. סה"כ יבול לעצם היה הגובה ביותר בבדיקה אבל היה פרי קטן (לא נבדק גודל פרי). אמון חנקתי + TDZ היה הנמוך ביותר ואילו טיפולים אחרים לא נבדלו בוניהם.



איור 17: יבול ממוצע לעץ בנקטרינה 222.

יבול לעץ נשלק בקטיפה. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 חושבו מ 6 חזרות לטיפול (עץ להזורה).

התפלגות הקטיף נבדקה באחיזים. ככלمر איזה איזה מהפרי נקטף במועד הראשון ואיזה בשני. נמצא כי בטיפול החנקן + TDZ רוב היבול נקטף במועד הראשון. יש לציין שנעשה קטיף מוקדם אותו לא בדקנו ולכן לא ידוע כמה נקטף מטיפול ה TDZ. בנוסף הרבה נשר לרצפה בגלל ההקדמה בהבשלה. יתרון והבדלים במשקלים מקורים ביבול שפספסנו ולא בפגיעה של החומר. גם טיפול החנקן 10% הראה הקדמה מסויימת ביחס לטיפולים אחרים כאשר טיפול משקי באלווזדר וטיפול הביקורתஇיחרו בהבשלה.



איור 18: אחד יבול במועד הקטיף השונים בנקטרינה 222.


אחד מסה"כ היבול לעץ חושב בשני מועד הקטיף השונים. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 חזרות לטיפול (עץ להזורה).

סיכום הון 222:

נראה כי טיפול החנקן בתוספת TDZ מקדים בהבשלה אבל עשוי לפגוע ביבול אם כי לא בוודאות. טיפול החנקן 10% הוביל להקדמה בפריחה מבליל לפגוע ביבול. טיפול הפיקאפ והדינואולטרא היו זהים והראו יכול זהה לאלווזוף והקדמה ביחס לאלווזוף, אם כי לא ביחס לחנקן. בזון בכיר זה יש חשיבות ייחודית להקדמת ההבשלה. מבחינה זו ראוי להמשיך ולבחון את הטיפוליים המבכירים ובמיוחד את האמון החנקתי עם TDZ.

תוצאות סמן סנו:

בניגוד לזה 222 בעל דרישות קור מעטות, הון סמן סנו דורש יחסית קור רב. עצמת הפריחה לא נבדלה בין הטיפוליים. יש לציין כי בסמן סנו ריכזו האמון החנקתי היה 4% כדי למנוע פגעה בפרחים. עצמת העלווה הייתה גבוהה ביותר בטיפול החנקן + TDZ ולאחריו בטיפול הפיקאפ והחנקן. עצמת העלווה בביבורת הייתה הנמוכה ביותר.



איור 19: עצמת פריחה ועלווה בסמן סנו.


עצמת פריחה ועלווה נערך על ידי מעריך יחיד. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 חזרות לטיפול (ען לחזרה).

בהערכות מועד שייא הפריחה נמצאו הבדלים קטנים בין הטיפוליים השונים.

טבלה 11: מועד שייאפריהה באפרסק סמר סנו יינון.

מועד שייאפריהה	טיפול
14/3	אלזודף
13/3	ביקורת
12/3	אמון חנקתי 6%
11/3	TDZ
12/3	динואולטרא 5
12/3	ניצן
13/3	פיקאפ

תוצאות הקטיף מוצגות עבור כל שורה בנפרד בגלל השונות הגדולה בין השורות בחלוקת מהטיפולים. בכל שורה יש 2 הזרות. בשורה 2 נמצא כי טיפול הפיקאפ וטיפול החנקן היו הטובים ביותר וממוצע המשקל היה 30 קילוגרם לעצם. יבול האלזודף היה השלישי ויתר הטיפולים לא נבדלו זה מזה כאשר ממוצע היבול עמד על 20 קילוגרם לעצם. בשורה 3 נמצא כי יבול טיפול החנקן היה הנמוך ביותר בדומה לביקורת. טיפול הנטן והдинואולטרא היו הטובים ביותר וטיפול הפיקאפ והאלזודף היו באמצעותם. קשה לקבוע מהנתונים האם הייתה פגיעה. נראה כי טיפול האמון חנקתי + TDZ היה נמוך ביחס לאלזודף בשתי השורות ואילו טיפול הפיקאפ גבוה מהאלזודף בשתי השורות אם כי לא במובהק.



איור 20: יבול ממוצע לעצם באפרסק סמר סנו.
יבול לעצם נשקל בקטיף. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 חושבו מ 4 הזרות לטיפול (ען לחזרה).

סיכום:

מסיכום הנתונים נראה שהורדת ריכוז החנקן בטיפול המשולב מנעה פגיעה בפריהה. יחד עם זאת ישנו פוטנציאל של פגיעה ביבול أولי בגין התערורות העלווה. נראה שטיפול משולב של אמון חנקתי + TDZ מוקדים הבשלה ועשוי להיות מוצלח בזכות מקדים. פוטנציאל הפגיעה בפרחים עשוי לשמש לדילול וצריך ללמידה את הנושא. אי לכך באפרסק לא הגיעו החזיז מסחרי ויש לשוב ולבחון את החומרים השונים בעצים בודדים במספר אзорים במקביל וגם להגדיל את מספר החזרות לטיפול בגין השונות האגוראה.

דובדבן:

בuckבות ממצאי השנים הקודמות נבחנו בשנת הניסוי הנוכחת שלושה זני דבדבן: בורלא, רואיל דון ורניר. הבדיקה נעשתה ב 4 חלקיות שונות: יונתן (600 מטר), רמת מגשימים (רמג"ש) (700 מטר), יראון (650 מטר). התוצאות נבדקה בהערכות בלבד. נבחנו הפרמטרים הבאים: עצמת פריהה, עצמת צימוח וגטטיבי ומועדシア פריהה. בנוסף נשקל היובל בקטיפם במועדי הקטיף השונים.


טבלה 12: טיפול דובדבן 2016.

מספר	טיפול	תッシュיות	שנה	מועד יישום	הערות
1	ביקורת	ללא טיפול			
2	ביקורת מסחרית	אלזורה 2.5%	טריטון 0.025%	5-פבר	
3	אמון הנקתי	10% אמון הנקתי נזולי	ארמויריאק 1%	5-פבר	היה מוצלה שנתיים.
4	חנקת אשלגן	חנקת אשلنן 115 גרם לפחות	ארמויריאק 1%	5-פבר	הגה לא אמון 2014 היה מוצלה
5	בלופרינס	חומר אטליקי	שטה של החבירה	5-פבר	היה מוצלה בהקדמת פריחה
7	תפוזל	פיק אפ 4%	זירקון 2%	5-פבר	היה מוצלה ב 2015
8	סינכרונ גדורות	סינקורן 2% ניטראקטייב 20%		5-פבר	היה מוצלה בהקדמת פריחה
9	תרסים	דינואולטרא 5 4%		5-פבר	מוצלה ב 2015

תוצאות:

רואל دون:

בעוד שעוצמות הפריחה לא השתנו ב观摩הק בין הטיפולים נמצא כי בטיפול האלוזוף עוצמת הצימוח הוגטטיבי הייתה גבוהה יותר בכל השטחים ואילו עוצמת הצימוח בבדיקה הייתה הנמוכה ביותר. יתר הטיפולים הראו פעילות פחותה וחזקת פחתות משל אלוזוף. ראוים לציון אמון חנקתי וסינכרון ביראון, בלופרינס ברמג"ש ובლופרינס ודינו אולטרה ביונתן.



איור 21: עוצמה פריחה ועלוה בון רואל دون באתרי הניסוי השונים. פירוט הטיפולים בטבלה 12. ממוצעים ושגיאות תקן מצוינים באוויר. מועד שיא הפריחה היה מוקדם בטיפול האלוזוף בכל שלוש האתרים ביחס לטיפולים האחרים. ביונתן טיפול האלוזוף הקדים ביוםיים במוצע את הטיפולים האחרים. ברמג"ש אמון חנקתי ופיקאפ הקדימו כמעט את הבדיקה.


ביראון נמצא כי סינכרון ואמון חנקתי הראו הקדמת פריהה מעטה יחסית לבקרות. יש לציין כי בכל החלקות טיפול הבדיקה פרה במועד המאוחר ביותר אם כי לא במובהק מטיפולים אחרים.

טבלה 13: מועדシア פריהה בזון רויאל דון.

טיפול	מועדシア פריהה רמגש	מועדシア פריהה יונטו	מועדシア פריהה יראון
אלזודף	10/3	12/3	12/3
ביקורת	15/3	15/3	18/3
אמון חנקתי	12/3	15/3	16/3
בלופרינס	13/3	15/3	18/3
динואולטרא5	13/3	15/3	17/3
חנקת אשلغן	14/3	15/3	17/3
סינכרון	14/3	15/3	15/3
פיקאפ	12/3	15/3	18/3


בבחינה של היבול נראה כי בדומה לשנים קודמות טיפול האלזודף מוביל לירידה ביבול גם אם לא מובהקת. יחד עם זאת ביראון גם בטיפול הבדיקה היה יבול נמוך שאיןו נבדל מטיפול האלזודף. טיפול האמון חנקתי הובילו גם הם לפחותה ביבול ברמג"ש ויונטו אבל לא ביראון. יש מקום **לצין השפעות חיוביות על היבול**. חנקת אשلغן ודינו אולטרה הגבירו היבול ביראון כלפי הטיפולים האחרים ובקרות.

בבחינה של מועד הקטיף נמצא כי בכל החלקות טיפול האלזודף הוביל להקדמה בהבשלה כאשר אחו משקלי גובה נקטף בקטיף הראשון ביחס לטיפולים האחרים. בנוסף טיפול הבדיקה אחר בהבשלה בכל החלקות ביחס לטיפולים האחרים. ביונטו נמצא כי גם טיפול האמון חנקתי אחר בהבשלה ביחס לטיפולים האחרים אך מאידך טיפול זה הקדים אם כי לא במובהק ביראון והוא במקום השני בהקדמה אחרי האלזודף.



איור 22: יובל ממוצע לעז (מימין) ואחו מוביל בכל קטיף (משמאל) בזון רווייאל דון.


בדיקה של קורלציות מראה כי בניגוד לאינטואיציה לא קיים מתאם בין עומס יובל למועד הקטיף, כך שיבול גובה אינו בהכרח מוביל לדחיה בהבשלה. בנוסף נמצא כי קיימת קורלציה חיובית אם כי לא מובהקת בין מועד שייאפריהה למועד ההבשלה, כך שהקדמה במועד הפריהה תוביל להקדמה במועד הקטיף. בנוסף נמצא כי לא קיים מתאם בין עוצמת הצימוח הוגטטיibi בפריהה לבין יובל ומועד קטיף, כך שעוצמת צימוח ווגטטיבית לא תוביל בהכרח לפגיעה ביובל.



אייר 23: מתאם בין היבול לאחוז משקלי בקטיפים השונים.

בורלא

ניסויון בבורלא נעשה ביוונון ורמגש בלבד. בבדיקה של מדדי עלווה ופריחה נמצא כי בלופרינס פגע בפריחה בשתי החלוקות אם כי לא במוובה. יתר הטיפולים לא נבדלו בהם משמעותית ועוצמות הפריחה היו בין 3 ל 4. בבדיקה של עלווה נמצא כי בדומה לרויאל دون גם בבורלא האלזודף הוביל להתעוורויות עלווה טובה. יחד עם זאת התעוורויות טוביה נמצאה גם בטיפול הפיק אפ. נראה שהגורם המעורר הוא TDZ ולא הסינכרון מאחר ולא נמצאה שונות בין החלוקות. התעוורויות טוביה נראית גם בבלופרינס אם כי התעוורויות עלווה זו נובעת מפגיעה בפרחים. נראה על כן כי מסתמנת השפעה שלילית של בלופרינס על פריחת הבורלא ברמג"ש וביונון וכן עידוד צמיחה וגטטיבית לפיק אפ בשני האתרים הצד אלזודף.




איור 24: עצמת פריהה ועלוה בון בורלא.

עצמת פריהה נקבעה על ידי מעריך יחיד במועד שיא הפריהה. עצמת עלוה נקבעה גם הוא במועד שיא הפריהה על ידי מעריך יחיד. עצמות נקבעו בסולם אחיד כמתואר באירור 3.

בון בורלא ברמגש טיפול האלזודף וטיפול הפיקאף הקדימו לפרוח ביחס לטיפולים אחרים כאשר טיפול של פיקאף ניתן בטעות עם סינכרון של גdots. הסינכרון בעצמו הוביל להקדמה מסויימת ונראה שיש מקום לבדוק שילובים בעtid. טיפול החנקן לא הוביל להקדמה בשני המטעים והיה כמעט זהה לביקורת.


טבלה 14: מועד שיא פריהה בון בורלא.

טיפול	מועד שיא פריהה רmagsh	מועד שיא פריהה יונtan
אלזודף	10/3	10/3
ביקורת	15/3	13/3
אמון חנקתי	14/3	12/3
בלופריננס	13/3	12/3
דינואולטראט	13/3	12/3
חנקת אשלגן	13/3	12/3
סינכרון	13/3	11/3
פיקאף	10/3	12/3




בבחינה של יבול לעז נמצא כי ביוונtan טיפול האלוזוף לא נבדל מהביקורת כאשר שני טיפולים אלו הראו את רמת היבול הגבוהה ביותר. יתר הטיפולים לא נבדלו ביניהם. ברגש מאידך הטיפולים הוטווים ביותר מבחן גובה היבול היו אמון חנקני, דימואולטרא, חנקת אשלאן והביקורת. היבול הנמוך ביותר היה בטיפול האלוזוף, הבלופרינס והסינכרון. שני

האחרונים הראו יבול נמוך גם ביוונtan. מבחינת מועד הקטיף נראה כי בשני האתרים האלוזוף הוביל להקדמה בקטיף כאשר 50% מהפרי נקבע בשלהות הקטיפים הראשונים ביוונtan ובארבעת הקטיפים הראשונים ברגש. ברגש נמצא כי גם האמון חנקתי הקדים כאשר 35% מהפרי נקבע בארבעת הקטיפים הראשונים.



איור 25: יבול ואחוד יבול בקטיפים השונים. דובדבן בורלא.

בחינת קורלציות נמצאה כי גם בבורלא ברומה לרויאל דון לא קיימת קורלציה בין משקל פרי לעז לבין מועד הבשלה. מאידך קיימת קורלציה בין מועד שיא הפריחה למועד ההבשלה.




איור 26: מתאם בין אחוז ממשקל כולל לבן מועדシア פריהה ויבול בן בורלא.

רניר

הבן רניר נבדק רק ביראון.

בבחינה של עצמת פריהה נראה כי הטיפולים לא נבדלו בניהם כאשר טיפול הבלופרינס היה הנמוך ביותר אם כי לא במובהק. מאידך עצמת העلوוה הייתה גבוהה ביותר בטיפול האלזודף, בדומה לזרנים הנוספים, ובטיפול הסינכרון.




איור 27: עוצמת פריהה וعلווה בן רניר

גם ברניר טיפול האלזודף הוביל להקדמה כאשר הפריהה נראית גם בטיפול הסינכרון. הקדמה מסויימת נראית גם בטיפול האמון חנקתי.

טבלה 15: מועד שייאפריהה בזון רנייר

מועד שייאפריהה יראון	טיפול
12/3	אלזודף
18/3	ביקורת
15/3	אמון חנקתי
17/3	בלופרינס
17/3	דינואולטרא 5
17/3	חנקת אשלגן
14/3	סינכרון
17/3	פיקאפ

בבחינת יבול נמצא כי היבול הנמוך ביותר היה בטיפול האלזודף ולאחריו בטיפול הבלופרינס, הפיקאפ והסינכרון. יחד עם זאת בדומה לזרים האחרים טיפול האלזודף הקדים בהבשלה כאשר 50% מהפרי נקטף כבר בקטייף הראשון ב-4.5. בטיפולים האחרים לא נקטפו פירות כלל בקטייף זה. בקטייף השני שהיה ב-11.5 נקטפו למעלה מ-60% מהפירות בטיפול הפיקאפ והסינכרון וכ-50% בשני טיפוליו החנקן. רוב הפרי בטיפול הדינואולטרא, הבלופרינס והביקורת נקטף במועד האחרון ב-15.5.



איור 28: יבול ממוצע לעץ ואחו משקלי בקטיפים השונים בזון רנייר.


סיכום:

מסיכום הנתונים נראה כי לא הצליחו למצוא טיפול המשתווה לטיפול האלזודף. בכל הזנים שנבחנו ובכל החלקות טיפול האלזודף הקדים בהתעוררויות ובהבשלה. בשנה האחורונה שהייתה שנה מוקדמת הייתה לכך השפעה גדולה על מחיר הפרי. בנוסף טיפול האלזודף לא תמיד פגע ביבול כאשר פחיתה גבואה ביבול נראית רק בזון רנייר ביראון. יחד עם זאת נמצא כי טיפול משולב של סינכרון ופיקאפ ברמנש הוביל להקדמה בבורלא. נראה כי שילוב של TDZ

וחנקן עשוי לשפר התעוורויות. טיפול האמון חנקתי הוביל להקדמה מסוימת ביחס לביקורת ברוב המקרים אבל לא במובהק. נראה שיש להקדים את מועד הריסוס בטיפול זה. בנוסף נמצא כי אין מתאם בין גובה היובל למועד הקטיף ונראה כי מועדシア הפריהה הוא הגורם המרכזי המוביל להקדמה בקטיף. בזנים בהם הקדמת הבשלה איננה משמעותית, יש לנו כמה חקרים שיוכלו להצביע את האלזודף בכללם להימנע מכל ריסוס.


קיומי:

בשלוש שנות הניסוי הראשונות נבחנו מספר תכשירים בקיומי. נמצא כי בבחינה של אחוז התעווררות סופים בכל ה Jahren, אחוז התעווררות טיפול האמון חנקתי + ארמוברייק היו זהים לטיפול המשקי. תוצאות זהות התקבלו גם בעבר טיפול ציטוקנין עם ולא אמון חנקתי.



איור 29: התעווררות פקעים כללית כל השנים. כחול: 2013, אדום: 2014, ירוק: 2015. א.ח. ניתן בראכוז של 8% בכל הטיפולים בתוספת ארמוברייק 1%. ספינון ניתן בראכוז של 50 ח"מ. בונגרו בראכוז של 500 ח"מ ו-TDZ בראכוז של 100 ח"מ.

בחינה של אחוז פקעים פוריים מסה"כ הפקעים נמצא כי בעוד טיפול האמון חנקתי לא פגע במספר הפקעים הפוריים ואף הגדילו אותו זה, נראה פגיעה בשנת 2014 בטיפול הציטוקנין מלבד טיפול הבונגרו. יש לציין כי בשנת 2015 שאופינה בחורף קר לא נבדלו הטיפולים מטיפול הביקורת הלא מרוסס ומהטיפול המשקי באחוז הפקעים הפוריים.



איור 30: אחוז פקעים פוריים כל השנים. כחול: 2013, אדום: 2014, ירוק: 2015. טיפולים כמפורט באיור 29.


מסיכום התוצאות נראה כי טיפול האמון חנקתי עם ולא ציטוקנין יכולים לשמש כתחליפים טובים ואף עדיפים על השימוש באלויזודף. יש לציין כי גם פגיעה במספר השriegנים הפוריים כפי שהתקבלה טיפול האמון חנקתי בתוספת TDZ לא השפיע בסופו של דבר על כמות הפרי לעצם. זאת לאחר ונעשה דילול פרי מיד לאחר חנטה.

בשנת הניסוי הוכחית נבחנו תכשירים שונים בשלוש חלקיות קיומיות: חלקת היוארד במלכיה וברעם בגליל העליון, וחלקת ברונו בשדה נחמה. פירוט הטיפולים בטבלה 16:

טבלה 16: פירוט הטיפולים שנעשו בקיומי במלכיה (היוארד), ברעם (היוארד) ובשדה נחמה (ברונו – צהוב).

מספר	טיפול	תכשירים	שטח	מועד יישום	הערות
1	ביקורת	לא טיפול			
2	ביקורת מסחרית	אלזודף 5% בשדה נחמה. 3% ברעם ומלכיה	טריטון 0.025%	25/2	
3	אמון חנקיי BA	8% אמון חנקיי בונגרו 500 ח"מ (1.25%)	ארמוברייק 1%	25/2	عبد טוב ב 2015
4	ספין	ספין 20 ח"מ (0.20%)	ארמוברייק 1%	25/2	ירידה ברכינו למניעת פגיעה בפוריות.
5	ספין	ספין 20 ח"מ (0.20%)	ארמוברייק 1%	25/2	ריכוז נמוך יותר ביחס ל 2015
6	אמון חנקיי TDZ	8% אמון חנקיי נזולי 300 TDZ (0.03%)	ארמוברייק 1%	25/2	היה מוצלח ב 2014 ו 2015. דווקא ריכוזים נמוכים פגעו בפוריות.
7	תפוזל	4% פיק אפ	2% זירקון	25/2	לא נוסה
8	אמון חנקיי	8% אמון חנקיי	1% ארמוברייק	25/2	טיפול שבמודל
9	ג'ן מור	8% ניצן בוסטר 2% בברעם	4% ניצן אקטיב	25/2	היה מוצלח שנתיים
10	תרסיס	5% דיניאולטרא 5		25/2	לא נוסה
11	בלופרינס	6% בלופרינס	1% ארמוברייק	25/2	לא נוסה

בשתי ההיוארד גם במלכיה וגם בברעם נמצא כי אחוז הפקעים המתעוררים בטיפול האמון חנקיי בשילוב עם TDZ או ספין היה גבוה הן לטיפול הביקורת והן לטיפול האלזודף המסחרי. בנוסף נמצא כי גם טיפול הספין לבדוק הוביל לשיפור בתערורות (איור 31). בברעם טיפול הניצן שנעשה רק בשטח זה הוביל גם כן לשיפור בתערורות ביחס לטיפול המשקי. גם אמון חנקיי הציג שיפור בפוריות שהשתווה לאלזודף. לעומת זאת, פגע טיפול הספין באחוז הפקעים הפוריים. בון ברונו נמצא כי טיפול האמון חנקיי בשילוב TDZ היה הטוב ביותר, כאשר טיפול האמון חנקיי והניצן לא נבדלו מהטיפול המשקי. יש לציין כי בון זה האחוז הפקעים הפוריים היה זהה בין הטיפולים ועמד על .40%




אייר 31: אחוז התיעוריות ואחוז שרגים פוריים בקיויו.

אחוז התיעוריות נמדד בכלഴה. לפני הטיפול סומנו 200 פקעים בכל שיח על 10 – 15 זמורות ואחוז הפקעים המתיעוררים ואחוז הפקעים הפוריים מסה"כ השריגים הצומחים נבדק לאחר התיעוריות מלאה. ממוצעים ושגיאות תקן ברמת מובהקות של 0.05 מצוינים באיור.

בספירה של מספר הפירות הממוצע לשיח נמצא כי במלכיה לא נבדלו רוב הטיפולים. יחד עם זאת מספר הפירות בטיפול המשקי באלוודף היה הנמוך ביותר במובhawk ביחס לטיפולי האמון החנקתי בשילוב עם TDZ. והדינואולטרא 5

בهم מספר הפירות המוצע לשיחή הגבואה ביותר (איור 31). בברעם מайдך השתוו כל הטיפולים לאלווזף למעט טיפול הביקורת בו מספר הפירות היה הנמוך ביותר. בשדה נחמייה נמצא כי מספר הפירות לשיחή הגבואה ביותר במובhawk בטיפול האמון חנקתי ביחס לטיפולים אחרים שלא נבדלו זה מזה. מאחר ובקיים נהוג לדלл את השיחים קשה לקבוע האם מספר הפירות לעז מושפע מהטיפול או מהדילול. יחד עם זאת נראה כי הטיפולים שנוסו לא הובילו לנזקים ולפחותה ביבול ביחס לביקורת הלא מרוססת.



איור 32: מספר הפירות המוצע לחורחה.

סיכום:

מסיכום הנתונים הרב שנתי נראה כי יש בידנו כמה חלופות טובות לשימוש באלווזף. טיפול האמון חנקתי בשילוב עם ארמוררייך כמשתח-מחדר נמצאו כמעוררים טובים כאשר אחוזי הפוריות גבוהים. טיפול משולב עם אמון חנקתי וציטוקנין הוביל במקרים מסוימים לפגיעה באחוזה השרגיים הפוריים, בשל אחוז התעוורנות גבוהה של שרגיים לשיח. מאחר ונראה כי אחוז הפוקעים הפוריים ירד בטיפול הספיון יש להימנע מהמשך הבדיקה של חומר זה בשלב זה. טיפול TDZ מיידך הראו תוצאות טובות הן ברמת התעוורנות, הן ברמת הפוריות והן ביבול ולכון יכולם להיבחן כחלופות לאלווזף גם ברמה חצי מסחרית. טיפול הניצן, הדינואולטרא והפיק אפ שיפרו גם הם התעוורנות ונראה כי גם טיפולים אלו יכולים להיבדק ברמה חצי מסחרית.

לסיכום תוצאות

סיכום התוצאות מראה כי בתפוח, אגס וקיויו יש בידנו מספר חלופות לאלווזף שיכולים להיבחן ברמה חצי מסחרית במספר אзорיו גידול ובמספר שנים של טיפולים עוקבים באותו טיפולים באותו העצים. באפרסק יש בידנו מספר חלופות אפשריות אך יש להמשיך ולבוחן את התכשיריים השונים ברמת הניסוי בעצים בודדים כשנה נוספת. בדובדבן אין עדין חלופה טובה, מאחר ונמצא כי הקדמה במועד ההבשלה התקבלה רק בטיפול המשקי. אי לכך יש להמשיך ולבוחן חלופות נוספות ממין זה.

המסקנות המדעיות וההשלכות על יישום המתקב

1. התוצאות עד עכשו הראו התכונות לשימוש חדש חנקתי כשובר תרדמתה בלבד עם המשטח ארמוררייך שטרם קיבל רישיון לשימוש בישראל. יחד עם זאת החומר מאושר לשימוש באירופה.
בנוסף התקבלו תוצאות טובות עבור החומר פיק אפ המורשה לשימוש בחומר ניצן. פוטנציאלי טוב בחלק מהמינים יש גם לדינוקאפ ודינואולטרא הנמצאים השימוש מסחרי גם כן.

שאלות סיכום

מטרות המהקר לתקופת הדוחת

מציאת שובי הטרדמה שיחליפו את השימוש באלווזר במטיע הנשיריים.

עיקרי הניסויים והפתרונות שהושגו בתקופה אליה מתיחס הדוח

בתקופת הניסוי הראשונה הדגש המהקרי היה על פסילה של חומרים שאינם מראים פוטנציאלי לשמש כшибרי תרדמה וזיהוי חומרים העשויים לשמש כшибרי תרדמה מסחריים. ניסויים נעשו בקנה מידה קטן (מספר חזרות מצומצם) במטרה לאפשר בדיקה של מספר גדול של חומרים בשילובים שונים. המהקר התמקד במינימום תפוח, אגס, דובדבן, אפרסק וקיווי כאשר בכל מנת נבחר צן מייצג. מסקנות השלב הראשון מאפשרות בחינה בקנה מידה גדול של טיפולים מצטינניים במטרה לבחון שימוש מסחרי בעתיד הקרוב.

המסקנות המדעיות וההשלכות על יישום המהקר

הנתונים שנמצאו עד כה נראה כי דשן חנקתי וביחוד אמון חנקתי בשילוב עם ארמובריריק יכול לשמש כתחליף לאלווזר בתפוח, אגס, אפרסק וקיווי.

הבעיות שנדרשו לפיתרון

החומרים לא נסעו בקנה מידה גדול ולא ברורה הצלחת חומרים אלו בישום מסחרי במרקם מפוח ובתנאי מזג אוויר משתנים.

האם הוחל כבר בהפצת המידע שנוצר בתקופת הדוח

כן בכנסים למגדלים (כנסי ראש פינה ב-12/2014 ב-12/2015 וכן בשני מאמריהם שפורסמו בעلون הנוטע: (קריין וחוב 2015, שבירת תרדמה ומפגש מפרים באגס: פיתוח חלופות לאלווזר. עلون הנוטע 70 (9): 37-41; קריין וחוב 2015, שבירת תרדמה בתפוח: פיתוח חלופות לאלווזר, עلون הנוטע 70 (10): 34-38).

פרסום הדוח

ניתן לפרסמו ללא הגבלה