

קוטלי עשבים בעגבניות


קוטלי עשבים בעגבניות

לתעשייה שתולות

**טריפלורלין (טרפלן, טריפלורקס 48, טריפלורן, טריפלוסאן)-**  
מתוחח סמוך לריסוס, לעומק עד 10 ס"מ, מונע הצצת דגניים, ירבוזיים, כף אווז,  
רגילת הגינה, חלמית ועוד.

**מינון-** לפי מועד הטיפול לפני השתילה, 150-250 סמ"ק לדונם.

**אזהרה-** מעכב את העגבניות בעיקר באדמות קרות. עשבים מתחמקים בכתפיים.  
ניתן לריסוס על הנוף והצנעה בתיחוח בין השורות.



**אוקסיפלורופן (גול, גליגן) -** קדם שתילה 150-200 סמ"ק לדונם.  
בעיית גשמים או עננות בזמן השתילה.  
בעיית התייבשות השכבה המטופלת.  
בעיית הזזת התכשיר.




**אוקסידאזון (רונסטר) - קדם שתילה 200-400 סמ"ק לדונם.**

עלול לפגוע בהתזת אדמה.

בעיית הזזת התכשיר.

בעיית התייבשות השכבה המטופלת.




אוקסידארג'יל (רפט) - קדם שתילה 100-150 סמ"ק לדונם.

פחות אלים לעגבניות.

בעיית הזזת התכשיר.

יש לחרוש לפני חיטה.



אקלונִיפּוֹן (צ'לנג') - קדם הצצה, קדם שתילה במינון 300-400 סמ"ק לדונם.



**פנדימתאלין (סטומפ) - קדם שתילה 300 סמ"ק לדונם, לשתילת  
מכונה בלבד (!)**

**מטריבוזין (סנקור) - 35-50 גרם לדונם, הפעלה במים לאחר התבססות  
הצמחים.**

**מדביר קשת רחבה של עשבים, לא ענבי שועל.  
שאריתי, צורב ללא הפעלת מים, אולם כדאי במינונים נמוכים.**



**רימסולפורון (טיטום) - 5-10 גרם לדונם בתוספת 0.05% משטח**

**סיבה.**

**מדביר קשת רחבה של עשבים כולל קוצ'אב וסעידה.**

**לא שאריתי.**

**סולפוסולפורון (מוניטור) - להדברת קשת רחבה של רחבי עלים**  
וסעידה במינונים של עד 5 גרמים לדונם, בתוספת 0.2% משטח D.X.  
שאריתי.

**אלאכלור (אלאפז, אלאנקס, לסו, אלאמור) - לא פוגע בעשביה  
קיימת, מונע בלבד, יש להפעילו מיידית, מרוסס כאשר העגבניות מבוססות.**

קוטלי דגן (ארילוקסי- פנוקסי- פרופיונט- דגנול, גלנט  
סופר, שוגון, פילוט סופר.  
ציקלוקסנדיונים- אלדגן, סלקט סופר, פוקוס אולטרא)-  
מדבירי דגן ברנניים לרחבי עלים. לא מדבירים גומא הפקעים.

